

العلاقة بين مغص الرضع والصداع النصفي

إجراءات هذه الدراسة من أجل معرفة الأسباب الترابط بينهم وتتضمن هذه الدراسة عدة جوانب وهي:

أولاً: الغرض من هذه الدراسة

معرفة العلاقة بين مغص الرضع والصداع النصفي في مرحلتى الطفولة والمراهقة.

ثانياً: وسائل الدراسة

يوجد مجموعة من الأطفال زاروا قسم الطوارئ في ثلاث دول أوروبية مختلفة بسبب الشعور بالتعب والإجهاد وتم تشخيصهم بالصداع النصفي أو صداع التوتر؛ والجدير بالذكر أن أعمارهم تتراوح بين (6:18) سنة.

بالإضافة إلى ذهاب بعض الأطفال من نفس عائلة الأطفال الثلاثة السابقين إلى الطوارئ في أماكن مختلفة من أجل الصداع أيضاً؛ وقاموا جميع الأطفال السابقين بملء استبيان لمعرفة تاريخ الصداع في الأسرة عند الطفولة.

ثالثاً: نتائج الدراسة

توصلت الدراسة التي إجراءات على الأطفال أن المصابين بصداع نصفي عانوا من مغص الرضع بنسبة 72.6%؛ بينما المصابين بالصداع النصفي المصحوب بالهلع قد عانوا من مغص الرضع بنسبة 69.7%؛ كما أن المصابين بحالات التوتر عانوا من مغص الرضع بنسبة 35.0% وهي أقل نسبة متواجدة.

نستنتج من هذه الدراسة أن المغص عند الأطفال هو شكلاً من أشكال الصداع النصفي المبكر.